

Alermuc®

Loratadina 10 mg

Venta libre
Industria Argentina

COMPRIMIDOS

¿QUE CONTIENE ALERMUC?

Cada comprimido contiene:

Loratadina 10 mg

Excipientes: lactosa, almidón de maíz, povidona y estearato de magnesio

Acción Terapéutica: Antialérgico

¿PARA QUE SE USA ALERMUC?

Está indicado para el alivio temporario de los síntomas causados por alergias respiratorias, como ser: secreción nasal, estornudos, lagrimeo, picazón en los ojos, nariz y/o garganta.

También está indicado para las alergias en la piel que se manifiestan con picazón, ronchas y enrojecimiento de la misma.

¿COMO SE USA ALERMUC?

Vía de administración: Oral.

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido de 10 mg de Loratadina por día, tomarse con agua, con o sin alimentos; no más de un comprimido por día.

La duración del tratamiento no debe superar los 5 días ininterrumpidos.

La dosis máxima recomendada de Loratadina es de 10 mg por día.

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ALERMUC?

No use este medicamento si usted es alérgico (hipersensible) a la Loratadina o a cualquiera de los componentes.

Niños menores de 12 años.

Si tiene enfermedad hepática y/o renal.

Si es asmático.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ALERMUC?

Consulte a su médico:

- Si tiene alguna enfermedad en hígado y/o riñones.

- Si está tomando antidepresivos, antibióticos y/o antimicóticos.

- Si sufre ataques de asma.

- Si tiene intolerancia hereditaria a ciertos azúcares.

- Si usted está tomando algún medicamento, o esta embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

- Si le van a efectuar cualquier tipo de prueba para alergias, no tome ALERMUC los días previos a la realización del estudio.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS TOMO ESTE MEDICAMENTO?

Puede producir cansancio, sedación, sueño, dolor de cabeza, mareos, náuseas y palpitaciones. En población pediátrica puede producir nerviosismo o irritabilidad.

Si usted toma al mismo tiempo algún medicamento sedante o alcohol, puede incrementarse el riesgo de que produzca sueño y que disminuya el estado de alerta. Evite el uso de cualquiera de los productos anteriores, junto a este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

Observe su respuesta a la medicación, porque puede producir disminución de la capacidad de reacción o somnolencia a las dosis recomendadas. Si así fuera, abstenerse de conducir y manejar maquina peligrosa.

Si los síntomas persisten por más de 5 días, empeoran o aparecen síntomas diferentes a los iniciales, consulte a su médico.

¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMO MAS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247

- Hospital Dr. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?

Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor: 0800 444 72666.

O, en caso necesario, al teléfono de ANMAT RESPONDE: 0800 333 1234.

Presentación: Comprimidos: Envases con 10 y 30 comprimidos.

Forma de conservación:

Conservar en lugar fresco y seco, preferentemente entre 15 y 30°C.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Elaborado en José E. Rodo 6424, C1440AKJ, C.A.B.A.

GRAMON MILLET S.A.: Fray J. Sarmiento 2350, B1636AKJ Olivos, Pcia. de Bs. As.

Directora Técnica: Julia García Buhlman, Farmacéutica.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 41.299

Fecha de la última revisión: Abril 2018.