

Mejoral

para niños
Paracetamol 80 mg

Mejoral

para niños Junior
Paracetamol 160 mg

Comprimidos masticables

Industria Argentina | Venta libre

¿Qué contiene Mejoral para niños?

Paracetamol (como Paracetamol microencapsulado).....80 mg.

Excipientes: Manitol granular, Almidón de maíz, Ácido cítrico anhidro, Esencia Black Tutti, Rojo allura laca aluminica CI 16035, Dióxido de silicio coloidal, Aspartame, Ciclamato de calcio, Estearato de magnesio.....c.s

¿Qué contiene Mejoral para niños junior?

Paracetamol (como Paracetamol microencapsulado).....160 mg.

Excipientes: Manitol granular, Almidón de maíz, Ácido cítrico anhidro, Esencia Black Tutti, Rojo allura laca aluminica CI 16035, Dióxido de silicio coloidal, Aspartame, Ciclamato de calcio, Estearato de magnesio.....c.s

Acción: Analgésico - Antifebril

¿Para qué se usa Mejoral para niños y Mejoral para niños junior?

Están indicados para el alivio sintomático de dolores (de cabeza y musculares) leves a moderados, alivio de estados gripales y/o resfriados y/o reducir la fiebre.

¿Cómo usar estos medicamentos?

Edad Peso	Mejoral para niños Paracetamol 80 mg	Mejoral para niños junior Paracetamol 160 mg
4-5 años ó 16-21 kg	2 comprimidos c/ 6-8 horas	1 comprimido c/ 6-8 horas
6-8 años ó 21-27 kg	3 comprimidos c/ 6-8 horas	2 comprimidos c/ 8 horas
9-10 años ó 27-32 kg	4 comprimidos c/ 6-8 horas	2 comprimidos c/ 6-8 horas
11-12 años ó a partir de 32 kg	5 comprimidos c/ 6-8 horas	3 comprimidos c/ 8 horas

Dosis máxima: 50 mg / kg / día.

No exceder la dosis máxima diaria.

No utilizar por más de 3 días para la fiebre ni más de 5 días para el dolor.

Los comprimidos pueden masticarse y/o deshacerse sobre la lengua de los niños.

También pueden ser disueltos con líquido (agua, jugos, yogurt).

En niños menores de 4 años: Consulte a su médico.

¿Qué personas no pueden recibir Mejoral para niños y Mejoral para niños junior?

NO USE estos medicamentos:

- Si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes.
- Si usted sabe que la aspirina u otros analgésicos le producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas.
- Si usted sabe que tiene una úlcera péptica activa o antecedente de úlcera recurrente, enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales o alcoholismo.

¿Qué cuidado debo tener antes de tomar este medicamento?

Si usted tiene antecedentes de enfermedades del tracto digestivo superior, por la posibilidad de gastritis, úlcera gástrica o sangrado gastrointestinal. No debe excederse de la dosis indicada. El Paracetamol puede producir daño hepático cuando se ingiere en sobredosis. No ingiera otra especialidad medicinal que contenga Paracetamol conjuntamente con este producto. La ingesta de Paracetamol puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre, fundamentalmente. Si bien es un medicamento de uso pediátrico, en caso de ser utilizado por un adulto y si consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica, consulte a su médico. Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como erupciones cutáneas (manchas, enrojecimiento, prurito), náuseas, vómitos y malestar gástrico. Se han notificado casos de alteraciones en la sangre. Si los síntomas persisten por más de 48 horas o empeoran suspenda la medicación y consulte a su médico.

¿Tiene ud. alguna pregunta?

En caso de ser necesario, comuníquese con la línea gratuita de atención al consumidor: 0800 444 72666. También puede hacerlo a ANMAT Responde, al tel.: 0800-333-1234.

ESTE PRODUCTO CONTIENE FENILALANINA

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247.
- Hospital Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

Presentaciones:

Mejoral para niños (Paracetamol 80 mg): Envases conteniendo 20 comprimidos masticables.

Mejoral para niños junior (Paracetamol 160 mg): Envases conteniendo 10 y 20 comprimidos masticables

Forma de conservación:

Conservar en un lugar fresco y seco, preferentemente entre 15° y 30° C.

Mantener fuera del alcance de los niños. Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.

Gramon Millet S.A.: Fray J. Sarmiento 2350, B1636AKJ, Olivos, Pcia. de Bs. As.

Mejoral para niños (Paracetamol 80 mg): Elaborado en Intendente Amaro Avalos 4208 (B1605ECT), Munro. Provincia de Buenos Aires.

Mejoral para niños junior (Paracetamol 160 mg): Elaborado en Intendente Amaro Avalos 4208 (B1605ECT), Munro. Provincia de Buenos Aires.

Directora Técnica: Julia García Buhlman, Farmacéutica.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 48.695. Fecha de última revisión: Noviembre 2017