

## ¿TIENE ALGUNA PREGUNTA RESPECTO A NEUMOBRON TOS?

Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor: **0 800 444 72666**

O, en caso necesario al teléfono de ANMAT  
RESPONDE: **0 800 333 1234**

**PRESENTACIÓN NEUMOBRON TOS JARABE:**  
Envase conteniendo 120 ml.

### IMPORTANTE:

- Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.
- Este medicamento, como cualquier otro, debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- No utilizar luego de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
- Mantenga el producto en su envase original y conserve el prospecto.

**CONSERVACIÓN:** Conservar en lugar seco a temperatura inferior a 30°C.

**ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.**

**CERTIFICADO N°:** 38.916.  
Directora Técnica:  
Julia García Buhlman, Farmacéutica.

**FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:** Octubre 2016.

Elaborado en Álvaro Barros 1113,  
B1838CMC Luis Guillón.  
Provincia de Buenos Aires.

GRAMON MILLET S.A.  
Fray Justo Sarmiento 2350, B1636AKJ.  
Olivos, Provincia de Buenos Aires.

**VENTA LIBRE.**  
INDUSTRIA ARGENTINA.

## Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento

### ¿QUÉ CONTIENE NEUMOBRON TOS?

Cada 100 mililitros de jarabe contiene:

**Ingredientes activos:** Bromhexina Clorhidrato 120 miligramos; Butetamato Citrato 120 miligramos.

**Ingredientes inactivos:** Sorbitol 70%; Ácido Clorhídrico; Sucralosa; Metilparabeno; Propilparabeno; Colorante rojo allura; Esencia de frutilla; Mentol cristal; Cremophor RH 40; Alcohol etílico; Glicerina; Agua purificada c.s.p. 100 mililitros.

Contiene alcohol etílico 0,44% p/v.

Sin azúcar.

### ACCIÓN.

Antitusivo y Mucolítico.

**CÓDIGO ATC:** R05CB02

### ¿PARA QUÉ SE USA NEUMOBRON TOS?

NEUMOBRON TOS se utiliza para calmar la intensidad y la frecuencia de la tos y para fluidificar las secreciones a fin de facilitar su expectoración.

### ¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR NEUMOBRON TOS?

**NO USE** este medicamento si es alérgico a alguno de sus ingredientes. Tampoco si padece úlcera gastroduodenal.

No debe administrarse a menores de 6 años, en embarazadas y mujeres en período de lactancia, salvo expresa indicación médica y en pacientes en

tratamiento con Disulfiram.

### ¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO? Lea detenidamente esta información.

Posología y forma de administración:

- **Adultos y niños mayores de 12 años:** 10 ml. cada 8 horas.
  - **Niños de 6 a 12 años:** 5 ml. cada 8 horas.
- Si los síntomas de catarro persisten por más de 2 días o empeoran, consulte con su médico. No administrar este producto por más de 5 días.

### ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Consulte con su médico antes de ingerir este medicamento en los siguientes casos:

- Si está tomando simultáneamente algún medicamento, por ejemplo otros medicamentos para la tos.
- Si va a ser utilizado en personas mayores de 65 años.
- Dado que durante este tratamiento es de esperar un aumento de la secreción, no es aconsejable en pacientes con dificultades para expectorar.
- Si usted es asmático o tiene antecedentes de alguna enfermedad respiratoria.
- Debe emplearse con precaución en pacientes con antecedentes de úlcera gastroduodenal, con enfermedades hepáticas y/o alcoholismo.
- Glaucoma (aumento de la presión del ojo).
- Retención de orina por enfermedades prostáticas.
- Estenosis pilórica (estrechamiento del píloro).
- Íleo paralítico (parálisis intestinal).
- Colitis ulcerosa.
- Miastenia gravis (enfermedad con debilidad muscular).

**NEUMOBRON TOS**  
Bromhexina | Butetamato

- **ANTITUSIVO**
- **MUCOLÍTICO**

JARABE

Contenido Neto:  
Envase con 120 ml.

### ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Pueden presentarse molestias gástricas (acidez estomacal), náuseas, vómitos y reacciones alérgicas en pacientes susceptibles. Se han reportado casos de reacciones intensas en la piel, asociadas a la administración de bromhexina. Estas lesiones pueden aparecer también en las mucosas de la boca, la garganta, la nariz, los ojos o en los genitales. Si estas lesiones aparecen, deje de utilizar este medicamento y consulte a su médico inmediatamente. Pueden también aparecer reacciones alérgicas de intensidad variable, caracterizadas por shock anafiláctico, angioedema (hinchazón rápida y progresiva de la piel, de los tejidos subcutáneos, de las mucosas o de los tejidos sub-mucosos) y picazón. Otras reacciones de piel intensas (tales como eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica).

### ¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

DIRÍJASE AL CENTRO DE ASISTENCIA MÉDICA MÁS CERCANO O COMUNÍQUESE CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CENTROS DE INTOXICACIONES.

• HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 ó 4658-7777

• HOSPITAL R. GUTIERREZ: (011) 4962-6666 ó 4962-2247