

Aderogyl

Contenido neto: 1 ampolla bebible
Industria Argentina - Venta bajo receta

Ampollas bebibles

Vitamina A - Ergocalciferol - Acetomenaftona

PRESENTACIÓN

Envase con 1 ampolla.

FÓRMULA

Por ampolla: Palmitato de Vitamina A 120.000 UI.
Ergocalciferol 15,0 mg, Acetomenaftona 7,5 mg,
Excipientes (Aceite esencial de naranjas dulces,
Aceite de maíz, Glicéridos polioxietilenados
glicosilados) c.s.p. 3 ml.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Vitaminoterapia A, D y K.

POSOLOGÍA Y MODO DE EMPLEO

Adultos: 1 ampolla por mes.

Niños: 1 ampolla cada 6 meses.

Verter el contenido de la ampolla en 1/4 de vaso de agua o jugos, y beberlo en ayunas o antes de las comidas.

PRECAUCIONES

Suspender el tratamiento en caso de síntomas de sobredosis.

En las indicaciones que necesitan grandes dosis repetidas, controlar calciuria y calcemia para evitar sobredosis.

Embarazo: no prescribir en altas dosis.

CONTRAINDICACIONES

Hipercalcemia, hipercalciuria y litiasis cálcica.

Hipersensibilidad a la Vitamina D. Sujetos inmovilizados.

EFFECTOS SECUNDARIOS

A las dosis indicadas no tiene efectos secundarios.

En caso de administración continua de dosis elevadas (mas de 50.000 unidades por día) pueden aparecer signos y síntomas de intoxicación por Vitamina D.

La ingestión continua de Vitamina A en dosis elevadas (mas de 50.000 a 100.000 unidades por día) puede producir signos y síntomas de intoxicación.

ANTAGONISMOS Y ANTIDOTISMOS

No posee.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 33.105

Elaborado en Int. A. Avalos 4208, (B1605ECT) Munro, Buenos Aires.

GRAMON MILLET S.A.

Fray J. Sarmiento 2350, B1636AKJ Olivos, Pcia. de Bs. As.

Directora Técnica: Julia García Buhlman, Farmacéutica.