

Apasmo® Compuesto

DIPIRONA PROPINOXATO CLORHIDRATO

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Industria Argentina Venta bajo receta

FÓRMULA:

Cada comprimido recubierto contiene:
Dipirona 300 mg, Propinoxato clorhidrato 5 mg.
Excipientes: Lactosa, Celulosa microcristalina, Povidona, Talco, Estearato de magnesio, Opadry II (compuesto por Alcohol polivinílico, Polietilenglicol 8000, Talco, Dióxido de titanio, Amarillo de quinoleína laca aluminica, FD&Red 40/ Rojo allura laca aluminica).

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antiespasmódico - Analgésico.

POSOLOGÍA:

1 a 2 comprimidos, 3 a 5 veces por día.
Ingerir los comprimidos enteros, sin masticar.

EFFECTOS COLATERALES:

APASMO® COMPUESTO es bien tolerado y en las dosis indicadas carece de efectos secundarios relevantes. En pacientes sensibles, la administración de dosis altas puede provocar sequedad de boca, constipación, náuseas, vómitos, irritación gástrica y somnolencia.

Nota: Este medicamento, por su contenido de Dipirona, puede ser responsable de una agranulocitosis. Excepcionalmente, puede observarse una anemia o trombocitopenia. Como todos los derivados pirazolónicos pueden aparecer reacciones alérgicas cutáneas.

CONTRAINDICACIONES:

Este medicamento está formalmente contraindicado en cualquier dosis en toda persona que haya presentado agranulocitosis causada o no por la Dipirona. No administrar durante el primer trimestre del embarazo.

Debe administrarse con precaución en pacientes con antecedentes de úlcera péptica activa o hemorragia gastroduodenal, estenosis pilórica orgánica, hipertrofia de próstata o glaucoma, insuficiencia hepatocelular severa,

insuficiencia renal severa, antecedentes recientes de rectitis o rectorragias. Alergia o intolerancia a la Dipirona o al propinoxato.

Lactancia: No usar durante la lactancia.

PRECAUCIONES:

Control renal y hepático en tratamientos prolongados. Observación periódica del cuadro sanguíneo, para evitar discrasias hemáticas. Este medicamento, por su contenido de dipirona, puede ser responsable de una agranulocitosis. Una coloración roja puede aparecer en orina a pH ácido y puede ser debida a un metabolito presente en cantidades muy pequeñas.

PRESENTACIÓN:

Envase conteniendo 20 comprimidos recubiertos.

SOBREDOSIFICACIÓN:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología: Hospital de Pediatría R. Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247. Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE INFERIOR A 30°C.

PROTEGER DE LA LUZ Y LA HUMEDAD.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Elaborado en Ruta 8, Km 60, Calle 12 N° 985, Pilar, Pcia. de Bs. As. Argentina.

GRAMON MILLET S.A., Fray J. Sarmiento 2350 (B1636AKJ), Olivos, Pcia. de Buenos Aires.

Directora Técnica: Julia García Buhlman - Farmacéutica ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD. CERTIFICADO N°: 23.567.

Información a profesionales y usuarios: 0800-444-7266.

3124702840
GM1207 1223
75/L239